

花粉などによる目のアレルギー症状に

ノールPガード点眼液


適正使用のチェックシート

使用指導のポイント

前頁の質問から使用可能な方には、
次のことを守って使用するよう指導してください

- 成分・分量：有効成分 ペミロラストカリウム8mg
添加物として、グリセリン、リン酸水素Na、リン酸二水素Na、ベンザルコニウム塩化物を含有します。
- 効能：花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：
目の充血、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、なみだ目、異物感（コココロする感じ）

使用方法 使う前に手をきれいに洗ってください。



用法・用量 成人（15歳以上）及び7歳以上の小児：1回1滴、1日2回（朝、夕）点眼してください。

<用法・用量に関連する注意>

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目の周囲に流れ出た液はすぐにふきとってください。
- 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。[汚染や異物混入（目やにやホコリなど）の原因となる] また、混濁したものは使用しないでください。
- 点眼用のみ使用してください。
- 用法・用量を厳守してください。
- 花粉など季節性アレルギーによる症状に使用する場合は、花粉飛散開始の1~2週間前から、又は花粉飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの使用が効果的です。
- 1週間位使用しても症状がよくなる場合、また、症状の改善がみられても使用期間が2週間を超える場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。

使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、添付文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤
目	充血、刺激感・しみる*、目やに、かゆみ*、痛み*

*目のまわりを含む

次の方には使用させないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある方

上記にあてはまらない方

次の方の使用には注意し、
場合によっては医師に相談するようにご指導ください

- 医師の治療を受けている方
- 妊婦又は妊娠していると思われる方
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある方
- 減感作療法など、アレルギーの治療を受けている方
- アトピー性皮膚炎や喘息等のアレルギー体質をもつ小児
- 次の症状のある方
はげしい目の痛み、強い異物感
- 眼球乾燥症候群（ドライアイ）の診断を受けた方、又はそのおそれのある方
- コンタクトレンズを装着している方
- アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない方
- とくに次のような場合はアレルギー以外の原因による症状の可能性があるので、使用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - ・片方の目だけに症状がある場合
 - ・目の症状のみで、鼻には症状が見られない場合
 - ・視力が低下した場合
 - ・目やにの多い場合

上記にあてはまらない方

ノールPガード点眼液を使用できます。



花粉などによる目のアレルギー症状に
ノールPガード点眼液