

セルフチェックシート



効能・効果

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。

用法・用量

◎リアップX5、リアッププラス、リアップ
成人男性（20歳以上）が、1日2回、1回1mLを脱毛
している頭皮に塗布する。

◎リアップジェット
成人男性（20歳以上）が、1日2回、1回薬液1mL（15噴射）を
脱毛している頭皮に噴射する。

**成分・分量
薬液100mL中**

◎リアップX5
ミノキシジル5.0g
添加物：1,3-ブチレングリコール、
ジブチルヒドロキシトルエン、リン酸、エタノール

◎リアッププラス
ミノキシジル1.0g、パントテニールエチルエーテル1.0g、
トコフェロール酢酸エステル0.08g、トメントール0.3g
添加物：カミツレ油、1,3-ブチレングリコール、クエン酸、エタノール

◎リアップジェット
ミノキシジル1.0g、パントテニールエチルエーテル1.0g、
トコフェロール酢酸エステル0.08g、トメントール0.3g
添加物：カミツレ油、1,3-ブチレングリコール、クエン酸、
エタノール、DME
(内容量100mL中には薬液67mL、噴射型33mLを配合)

◎リアップ
ミノキシジル1.0g
添加物：プロピレングリコール、エタノール

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある。

女性である。

20歳未満である。

家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人はいない。

頭髪が簡単に抜けてしまったり、
脱毛の部分が円形や楕円形で、脱毛部分にうぶ毛がない。

急激に脱毛している。

頭皮にきず、湿疹あるいは炎症(発赤)がある。

以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛ではない。



高血圧・低血圧で現在治療を受けている。
狭心症等、心臓に障害がある。

甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、
甲状腺機能亢進症)の診断を受けている。

薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば、
発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こした
ことがある。高血圧又は低血圧である。
心臓や腎臓に障害がある。むくみがある。

上記のいずれにも該当しない方は右に○をしてください。

使用上の注意や製品パッケージに記載された事項をよくお読みになり、購入してください。

65歳以上の方へ

一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなるため、
使用する前に、医師又は薬剤師にご相談ください。

「リアップX5」「リアップジェット」「リアッププラス」「リアップ」を使用しているときのご注意

★以下のような場合には、ご使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

- 頭皮に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ひけ、使用部位の熱感等の
症状があらわれた場合。
- 頭痛が起きた場合。
- 胸の痛みがでたり、心拍が速くなったり、気が遠くなったり、
めまいが起きた場合。

- 原因のわからない急激な体重増加がみられた場合。
- 手足がむくんだ場合。
- 脱毛状態の悪化や、頭頂部だけでなく側頭部や後頭部などの
頭部全体の脱毛、頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛 な
どがみられた場合。

■「リアップX5」をご購入の場合

必ず下記の説明文をお読みください。

「リアップX5（5%ミノキシジル製剤）」は臨床試験において、「リアップ（1%ミノキシジル製剤）」に比べ、
有効成分ミノキシジルの含有濃度が高く、接触皮膚炎や湿疹等の皮膚症状の副作用発現頻度が高い結果を得ていますが、有効性（毛髪数の変化）においては優れ
る結果を得ています。
それぞれの薬剤の特徴を充分理解したうえで、製品のご購入をお願いします。
また製品を選択するうえでわからない点がありましたら、必ず薬剤師にご相談ください。